

| | Variedades cultivares | XL Tamanho fruto | Envergadura da planta | Horas de frio | Período de Produção >> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|----------|----|----|----|
| | | | | | Maio | | | | Junho | | | | Julho | | | | Agosto | | | | Setembro | | | |
| | | | | | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
| Northern Highbush | Duke | L | Robusta | 800 - 1000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | New Hanover | L | Semiereta | 500 - 800 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cipria | L | Robusta & Ereta | 700 - 800 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bluecrop | L | Robusta & Ereta | 800 - 1000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brigitta | L | Robusta & Ereta | 800 - 1000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Legacy | M | Robusta & Horizontal | 700 - 800 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chandler | XL | Robusta & Semiereta | 1000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liberty | L | Ereta | 800 - 1000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ozarkblue® | L | Robusta & Ereta | 600 - 800 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Southern Highbush | O'Neal | L | Semiereta | 400 - 500 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alix Blue | L | Vigorosa | 400 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Star® | L | Ereta | 400 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Misty | M | Ereta & Aberta | 150 - 300 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gupton | L | Ereta | 400 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabbiteyes | Skyblue® | L | Robusta & Semiereta | 300 - 700 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powderblue | M | Robusta & Ereta | 300 - 700 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Columbus® | L | Robusta & Ereta | 600 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Centrablue® | L | Ereta | 300 - 700 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

> A tabela com o calendário de produção das variedades acima enunciadas é meramente ilustrativa e tem um comportamento diferenciado com base nas diferentes zonas do território nacional. Podem existir variações nas informações presentes na tabela.